

Nowe stanowiska *Phallus Hadriani* w Polsce

BOGDAN JAKUCZUN

Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego, Międzyzdroje

B. Jakuczun, The Natural Museum of Wolin National Park, Międzyzdroje, Poland.

The new stands of Phallus Hadriani in Poland

The author has found two new stands of *Phallus Hadriani* Venten ex Pers. on the seaside's dunes of islands Wolin and Uznam (Poland's western seaside).

Do kilkunastu znanych już w Polsce stanowisk (Skirgiełło 1970) rzadko występującego u nas sromotnika fiołkowego, *Phallus Hadriani* Venten ex Pers., chciałbym dorzucić dwa dalsze.

We wrześniu 1970 r. stwierdziłem występowanie tego grzyba na wybrzeżu wyspy Wolin i polskiej części wyspy Uznam. Szczególnie licznie wystąpił on na wydmach Uznamu. Zaobserwowałem tam ponad 20 dorodnych owocników rosnących pojedynczo na czole wydmy białej w sąsiedztwie *Ammophila baltica* i *Elymus arenarius*.

Na wyspie Wolin napotkałem jedno zwarte stanowisko na wschód od Międzyzdrojów, u podnóża Kawczej Góry. Charakterystyczne tutaj wybrzeże klifowe nie jest typowym siedliskiem sromotnika fiołkowego, który jest charakterystyczny dla zespołu *Elymo-Ammophiletum* Westhoff 1947. Na niewielkiej łączce odgródzonej od morza opaską betonową naliczyłem 8 owocników. W najbliższym sąsiedztwie rosły gęste zarośla *Hippophaë rhamnoides*.

Ze względu na rzadkość występowania tego interesującego grzyba należałoby otoczyć opieką jego stanowiska oraz zwrócić baczniejszą uwagę na występowanie w granicach Polski.



Ryc. 1. *Phallus Hadriani* Venten ex Pers.

LITERATURA

- Skirgiełło A., 1970, Materiały do poznania rozmieszczenia geograficznego grzybów wyższych w Europie III, Acta Mycol. 6: 101-123.