

Contribución al Estudio de las Palmetas de Colombia

J. M. DUQUE JARAMILLO.

Taxonomista de la Sección de Bosques
del Ministerio de la Economía Nal.

(Especial para la Revista "Facultad Nacional de Agronomía").

Esta nómina vernacular y científica de la mayor parte de las palmeras de Colombia, indígenas e introducidas, constituye un trabajo destinado a la formación del "Catálogo Vernacular y científico de la Flora Colombiana", inédito y elaborado conforme identificaciones botánicas de los profesores M. Burret (palmas), H. Harms, N. L. Britton, E. P. Killip, P. C. Standley, H. Pittier, Triana, Mutis, etc., y patrones visados en los herbarios de Berlin y Washington y observaciones del suscrito durante treinta años. En cuanto a palmas se ha consultado para normas científicas la mayor parte de los trabajos originales berlineses del mayor especialista en palmas, M. Burret, del Herbario de Berlin, Dahlem, las recientes publicaciones de "Indez of American Palms", por B. P. Dahlgren, del Museo de Historia Natural de Chicago, Estados Unidos. También el capítulo de Palmas de "Flora Brasiliensis", por Martius, Eichler & Urtlan, la nómina de identificaciones hechas por M.

Burret de los envíos a Berlin, practicados por el suscrito en distintas épocas desde Cali, Colombia.

Orden: PRINCIPES.

Familia: PHOENICACEAS o ARECACEAS RCHB

Géneros, especies, nombres vulgares, lugar de recolección y coleccionadores:

Género:

ACROCOMIA

Acrocomia antioquiensis Pos et Ar.
(Corozo amolado, corozo chileno, corozo grande, chupa-chupa). Río Arma.—Col. Posada A.

Género:

AIPHANES WILLD

Aiphanes caryotifolia (H. B. K.) Wendl. (Corozo chico mararay). Colombia.—Col. H. et B.

A. sp. (Corozo chico serrano). Aberrajal, Río Buey (Ant.). — Col. Duque J.

A. caryotioides (H. B. K.) Wild. (Palmita Bolívar cresta de gallo). Colombia.—Col. H. et B.

A. Duquei Burret. (Corocilla espinoza). Nacimiento del Río Cali. — Col. Duque J.

A. hirsuta Burret. La Víbora (Ant.). Col. Kalbrey.

A. hórrida Burret. La Víbora (Ant.). Col. Kalbrey.

A. Kalbreyeri Burret. Departamento de Santander.—Col. Kalbrey.

A. Killippii. Departamento de Santander.—Col. Killip.

A. leiopatha Burret. Departamento de Antioquia.—Col. Kalbreyes.

A. Lindeniana Wed. (Albarico corocilla). Cordillera Central. — Col. Linden.

A. Linearie Burret Cinegeta. Antioquia.—Col. Kalbreyer.

A. monostachys Burret Murri. Antioquia.—Col. Kalbreyer.

A. pachiclada Burret. Río Rosario (Ant.).—Col. Kalbreyer.

A. parvifolia Burret. Alto Caldera (Ant.).—Col. Kalbreyer.

A. simplex Burret. (Perrero espinoso). Río Verde (Valle). — Col. Kalbreyer.

Género:

AMMANDRA COOK

Ammandra Decasperma Cook. Buenaventura.

Género:

ASTEROGYNE WENDL

Asterogyne martiniana Wendl. (Hoja de gallo). Murri (Ant.).—Col. Kalbreyer.

A. minor Burret. (Hoja cesteña de gallo). Barbacoas (Nariño).—Col. Lehmann.

Género:

ASTROCARYUM G. MEYER

Astrocaryum Guara Burret. (Guará). Orteguaza. — Col. Woronow.

A. gymnopus Burret. Cassiquiare. Col. Luetzelbug.

A. Jauari Mart. (Yauaray). Hoya amazónica.—Col Adol Ducke.

A. Malybo Karst. (Chingalé, palma estera). Río Magdalena.— Col. Karsten.

A. vulgare Mart. (Cumare). Hoya amazónica. — Col. Martius.

Género:

ATTALEA H. B. K.

Attalea amygdalina H. B. K. (Taparo, palma almendrán, mangué). Guaduas.—Col. H. et B.

A. ferrugina Burret. (Palma curúa). Hoya amazónica.—Col. Huebner.

A. gomphococca Mart. (Corozo real, cohune, manaca). Darién. Según Standley.

A. nucifera Karts. (Palma de cuesco). Guaduas (Tolima). —Col. Karsten.

A. rynchocarpa Burret. (Almendrán cimarrón). Valle.—Col. Duque J.

Género:

BACTRIS JACQ

Bactris cuesco Engel. Cuesco cimarrón). Límites con Venezuela. — Col. F. Engel.

B. Cubaro Karst. (Cubaro). Villavicencio.—Col. Karsten.

B. gymsthata Burret. (Uará). Río Cassiquiare. — Col. Luetzelburg.

B. hirta Mart. (Chonta). Leticia. Col. E. Ule.

B. Kalbreyeri Burret. Murri, Cinegeta.—Col. Kalbreyeri.

B. Luetzelburgii Burret. (Cuarito espina). Río Cassiquiare. — Col. Luetzelburg.

B. macrotricha Burret. (Chonta). Murri, Cinegeta.—Col. Kalbreyer.

B. minor. (Chonta lata, palma lata). Santa Marta y Barranquilla. — Col. Dr. Arnold.

B. hueberianus Burret. Río Caquetá. Col. A. Ducke.

B. obovata Burret. (Chonta espin-

lla). Rios Caquetá y Ortegúaza.
Col. Woronow.

B. pilosa Karst. (Macanilla corozo).
Peñas Blancas, Río Magdalena.—
Col. Karsten.

B. piritu (Karst) Weld. (Piritu, ju-
via). Colombia.—Col. Karsten.

B. Santae Paulae Engel. (Chonta
Santa Paula). Peñas Blancas. —
Col. Engel.

B. sigmoidea Burret. La Yore (Mag-
dalena).—Col. Kalbreyer.

B. tenuis Wallace. (Chonta jú). Río
Vaupés.—Col. Spruce.

B. uaupensis Spruce. (Chontaduro
vaupenses). Río Vaupés.— Col.
Spruce.

Género:

CALYTROGYNE WENDL

Calytrogyné Kalbreyeri Burret. U-
ranao (Ant.).—Col. Kalbreyer.

Género:

CARYOTA L.

Caryota urens L. (Palma asiática
de vino, palma penacho militar).
Jardines (Cali).—Col. Duque J.

C. Lour. (Palma malayana chica de
vino). Jardines (Cali). según Bu-
rret.

Género:

CASTOBLASTUS WENDL.

Castoblastus microcarpus Burret.

(Palmicho). Ocaña. (Santander.
Col. Kalbreyer.

C. preamosus (Willd). (Drapa, py-
ra). Hoya amazónica. — Col.
Willd.

C. pubescens (Karst) Wendl. (Cor-
neto llanero). Llanos orientales.
Col. Karsten.

C. velutinus Burret. Murri (Ant.).
Col. Kalbreyer.

Género:

CATOSTIGMA HOOK & DOYLE.

Catostigma aequale (Hook & Doyle)
Burret. (Zancuda, P. crespá). Co-
lombia.—Col. H. & Doyle.

C. anomalum Burret. Caquetá, Su-
cre.—Col. Woronow & Juz.

C. Dryanderæ Burret. Buenaventu-
ra.—Col. E. Dryander.

C. Kalbreyeri Burret. Cauca, La Me-
sa (Cund.), Antioquia. — Col.
Kalbreyer.

C. radiatum Hook & Doyle. (Gual-
te, sapé). Colombia.—Col. Hook
& Doyle.

C. sphaerocarpum Burret. Amalfi, La
Vibora.—Col. Kalbreyer.

C. sphaerocarpum var. *microcaryum*
Burret. Amalfi, La Vibora.—Col.
Kalbreyer.

Género:

CHAMAEDOREA WILLD.

Chamaedorea Columbica Burret.

(Marambita, molinillo). Nacimien-
to (Cali).—Col. Dryander.

Ch. flavo-virens Wendl. Cordillera
Central.—Col. Wendl.

Ch. Kalbreyeriana. (Pacaya). Cor-
dillera Central.—Col. Kalb.

Ch. pinnatifrons (Jacq). Cord. Oc-
cidental.—Col. Duque J.

Género:

CHELYOCARPUS DAMMER.

Chelyocarpus Wallisii (Wendl). Bu-
rret. (Aguaje). Regiones orientales.
Col. Wallis.

Género:

CEROXYLON HUMBOLDT ET
BONPL.

Ceroxylon andicola H. et B. (Palma
blanca de cera). Andes colombia-
nos.—Col. H. et B.

C. Beethovenia Burret. (Palma ne-
gra de cera). Colombia. — Col.
Karsten.

C. ceriferum (Kart) Burret (P. ben-
dita de cera). Colombia. — Col.
Karsten.

C. coarctatum (Engel) Wendl. (P.
morena de cera). Cordillera Cen-
tral.—Col. Engel.

C. Flocosum Burret. Angostura (An-
tioquia).—Col. Kalbreyer.

C. interruptum (Karst) Wendl. Co-
lombia.—Col. Karsten.

C. quinduense (Kart) Wendl. (P.

blanca chica de cera). Linea
Quindio.—Col. Triana.

C. Schultzzei Burret. (P. cariba de
cera). Sierra Nevada. — Col.
Schultze.

C. utile (Karst) (Wendl). Colombia.
Col. Engel.

Género:

COCOS L.

Cocos nucifera L. (Palma de coco,
cocotero). Valles profundos y
Costas. Según Burret.

Género:

COPERNICIA MART.

Copernicia tectorum Mart. (Palma
de sombrero, cobija, palma redon-
da llanera). Llanos orientales y
Venezuela. — Col. Pittier.

C. Santae Martae. Palmiche redon-
do). Santa Marta.

Género:

COROZO GISEKE.

Corozo oleifera (H. B. K.) Bailey.
Corozo colorado, noli, nol-é).
Rio Magdalena.—Col H. et B.

Género:

CRYSOPHILA BLUME.

Crysofila Kalbreyer (Dammer)
Burret. Colombia. — Col. Kal-
breyer.

Género:

DESMONCUS MART.

Desmoncus horridus Splitg. (Behuco albarico matamba). Sierra Nevada.—Col. Shultze.

D. setosus Mart. (Coqueiro). Rio Caquetá.—Col. Martius.

Género:

DICTYOCARYUM WENDL.

Dictyocaryum platysepalum Burret. (Barrigona). La Mesa (Ant.).—Col. Kalbreyer.

D. Shultzei Burret. (Palma real nativa). Sierra Nevada y Santa Marta.—Col. N. Shultze.

Género:

ELAEIS JACQ.

Elaeis guineensis L. (Palma de aceite u ovoira africana de aceite). Cultivada en la Granja de Palmira.—Col. Duque J.

Género:

EUPRITCHARDIA SEEMAN
& WENDL.

Eupritchardia pacifica O. Kuntze. (Palma amarilla de abanico). Jardines (Cali).—Col. Duque J.

Género:

EUTERPE GAERTN.

Euterpe andina Burret. (Chilco).

Cerca de Bitaco (Valle). — Col. E. Dryander.

E. aphanolepis Burret. Quebrada Los Grados (Cali). — Col. E. Dryander.

E. Duquei? (Burret?) (Palmicho verde guada). Nacimiento (Cali). Col. Duque J.

E. datystachis Burret. Departamento de Santander.—Col. Kalbreyer.

E. Carderii (Hook) Burret. Departamento de Antioquia, según Burret.

E. brevicaulis Burret. Rio Porce (Antioquia). — Col. Kalbreyer.

E. frigida (H. B. K.) Burret. (Macanilla blanca, M. tranca). Rio Cali (Duque J.) según Burret.

E. Kalbreyer Burret (Maquenque). Rio Porce (Ant.).—Col. Kalbreyer.

E. Karsteniana Engel (Albarico blanco). Limites de Venez. — Col. Engel.

E. latsecta Burret. Guatapé (Ant.). Col. Kalbreyer.

E. microcarpa Burret. Rio Porce (Ant.).—Col. Kalbreyer.

E. purpurea Engel. (Palmicho colorado). N. de Santander. — Col. Engel.

E. precatória Mart. (Assais). Reg. orientales según Martius.

Género:

GEONOMA WILLD.

- Geonoma acutangula* Burret. Depto. de Santander.—Col. Kalbreyer.
- G. amoena* Burret. La Planta (Huila). — Col. C. Lehmann.
- G. anomoclada* Burret. Bitaco (Valle).—Col. E. Dryander.
- G. aulacophylla* Burret. Alto S. José (Ant.).—Col. Kalbreyer.
- G. calyptrogynoides* B. Cauca, La Mesa.—Col. Kalb.
- G. capyloclada* B. Arizal (Ant.).—Col. Kalb.
- G. concinna* B. Tabor y Alto Caldera (Ant.).—Col. Kalb.
- G. cuneatoidea* B. Murri (Ant.).—Col. Kalb.
- G. densa* Linden & Wendl. Cachiri. Col. Funk et Schelim.
- G. dicronospadix* B. Antioquia. — Col. Kalb.
- G. Dryanderæ* B. El Nogal. Rio Tuluá.—Col. Dryander.
- G. euterpoidea* B. Alto Guatapé, (Ant.).—Col. Kalb.
- G. fontinensis* B. Frontino (Ant.).—Col. Lehmann.
- G. goniocarpa* B. El Plateado, Murri.—Col. Kalb.
- G. graciliana* B. Murri (Ant.). — Col. Kalb.
- G. grandifrons* B. Cinegeta, (Ant.). Col. Lehmann.
- G. iodolepis* B. Amalfi (Ant.). — Col. Kalb.
- G. iodoneura* B. Teorama, Santander.—Col. Kalb.
- G. lauxiflora* var. *depauperata*. Trail Caquetá).—Col. Hubner.
- G. Kalbreyeri* B. Pulperias, (Ant.). Col. Kalb.
- G. Lehmannii* B. Cinegetas, (Ant.). Col. Kalb.
- G. lepidota* B. Rio Dolores. Sta. Rosa (Ant.).—Col. Lehmann.
- G. leucotricha* B. Tibajas (Ant.).—Col. Kalb.
- G. lindeniana* Wendl. Los Capachos (Ant.).—Col. Funk.
- G. linearifolia* Karst. Bogotá, Servitá—Col. H. Karsten.
- G. linearis* B. Rio Telembi.— Col. F. C. Lehmann.
- G. macroura* B. Tambú (Ant.). — Col. Kalbreyer.
- G. macroclada* B. Titiribi (Ant.).—Col. Kalb.
- G. microclada* B. El Oro, Supia, Rio Cauca.—Col. Lehmann.
- G. megaloptila* B. Catatumbo. Rio Mag.—Col. Kalb.
- G. molinillo* B. (Palmita molinillo), Nacimiento. Rio Cali.—Col. Duque J.
- G. mucronata* B. Dos Quebradas, (Ant.).—Col. Kalb.
- G. pachyclada* B. San Pedro, Santander.—Col. Kalb.
- G. paleacea* B. Medellín y Nare, Antioquia).—Col. Kalb.

G. paniculigera B. Rio Caquetá y La Mesa.—Col. Kalb.

G. paradoxa B. Rio Telembi, Barbaocoas.—Col. Lehmann.

G. pinnatifrons Willd. (Palma rabo de gallo). Sierra Nevada.—Col. Kalb.

G. plicata B. Alto de San José, Ant. Col. Kalb.

G. pumila Linden. Sierra Nevada. Col. Linden.

G. pulchra Engel. (Verduguillo). Rio Mag., Catatumbo. — Col. Kalb.

G. purdiana Spruce. Riohacha. — Col. Purdie.

G. ramosissima B. Cinegeta (Ant.). Col. Kalb.

G. rhytidocarpa B. Sisabita, Santander.—Col. Kalb.

G. rivalis Kalbreyer et Burret. El Coco (Ant.).—Col. Kalb.

G. stenothyrsa B. San Carlos, Ant. Col. Kalb.

G. simplisifrons Willd. Venezuela y Colombia.—Col. Karst.

G. Stuebelli B. Cerro Muchique, Popayán.—Col. Stueb.

G. trichoclada. (Palmicha hoji-tijereta). Guanacas, Cauca. — Col. F. C. Lehmann. (D. J.).

G. uncibracteata B. Cuchilla de Patascoy.—Col. Stueb.

G. undata Klottzsch. (Palmicho blanco cananá). Rio Nare y Quindio. Col. Kalb.

G. wendlandiana B. Concordia, Ant. Col. Kalb.

Género:

GUILLIELMA MART.

Guilielma caribae (Karst) Wendl. (Macana costeña). Costa Atlántica.—Col. Karsten.

G. Chontaduro Tr. (Chontaduro cartagüeño). Cartago, Valle.—Col. Triana y Karst.

G. gasipaes (H. B. K.) Bailey. (Chontaduro colombiano, pipire). Valle del Cauca.—Col. Bailey.

G. gasipaes var. *Chiquichique* Karst. (Chiquichique Magd.). Rio Magdalená.—Col. Karst.

G. gasipaes var. *Chicagui* Karst. (Macana chicagui). Rio Magd.—Col. Karst.

G. gasipaes var. *ochracea* Bar, Rod. (Tapire). Bar. Rod.—Col. Karst.

Género:

HYOSPATHE MART.

Hyospathe simplex B. Rio Dagua, Los Cornos.—Col. Lehmann.

H. Lehmannii B. Buenaventura. — Col. Lehmann.

Género:

IRIARTEA RUIZ ET PAVON.

Iriartea Corneto (Karst) Wendl. (Corneto llanero). Llanos orienta-

les.—Col. Karst.

I. deltoidea R. et P. (Corneto cho-coano). Panamá y Chocó. Según Standley.

I. megalocarpa B. (Corneto negro). Tetomá, Ant.—Col. Kalb.

I. setigera (Mart.) Wendl. (Corneto caqueteño). Caquetá.—Col. Martius.

I. ventricosa Mart. (Corneto barrigón). Caquetá y Putumayo. —Col. Martius.

Género:

IRIARTELLA WENDL.

Iriartella setigera (Mart.). (Cornetico). Caquetá.—Col. Martius.

Género:

JESSENIA KARST.

Jessenia Bataua (Mart). Burret. (Bataua). Regiones orientales.—Col. Huer.

J. polycarpa Karst. (Seje, mil pesos llanero, unamo, unamá, coroba). Regiones orientales.—Col. Karst.

J. repanda Engel. (Lechera mil pesos). Rio Magd. y limites con Venez.—Col. Engel.

Género:

KALBREYER BURRET.

Kalbrejera triandra B. Murri (Ant.). Col. Kalb.

Género:

LEOPOLDINIA MART.

Leopoldinia Piassaba Wallace. (Chiquechique cordel, titia). Reg. orientales. Según Pittier.

L. pulchra? (Jarao o Joroba). Trapecio amazónico.

Género:

LIVISTONA L.

Livistona chinensis R. Br. (Palma de Bourbón). Parque de Berrio, Medellin. Según Britton.

Género:

MANICARIA GAERTN.

Manicaria Martiana B. (Ipicara, timiche). Colombia, según Burret.

Género:

MAURITIA L. F.

Mauritia carana Wallace. (Caraná). Afluentes del Amazonas. Según Pittier.

M. flexuosa L. F. (Moriche, bache, mariti). Llanos orientales. Según Pittier.

M. macroclada Burret. Antioquía.—Col. W. Kalb.

M. minor Burret. (Canangucha). Florencia, Caquetá.—Col. Juzep-zuk.

M. vinifera Mart. (Palma amazóni-

ca de vino). Regiones orientales.
Col. Martius.

Género:

MAURITIELLA BURRET.

Mauritiella aculeata (H. B. K.) Burret. (Cabuaia). Cassiquiare. — Col. Spruce.

Mauritiella subinermis (Spruce) Burret. (Uliya). Cassiquiare. — Col. Spruce.

Género:

MAXIMILIANA MART.

Maximiliana regia Mart. (Maripa caribe, inaja, anajá, cokerite, cucurito). Regiones orientales. Según Martius.

M. elegans Karst. Colombia. — Col. Karsten.

Género:

MORNENIA RUIZ ET PAVON.

Mornenia corallina Karst. (Matamba). Sierra Nevada. — Col. Karsten.

M. lindeniana Wendl. (Caña San Pablo). Ocaña, Santander. — Col. Engel.

M. montaña. (H. B. K.) Burret. (Caña de Víbora). Almaguer, Nariño. — Col. H. et B.

M. robusta Burret. (Matambita cococilla). Los Alpes, Rio Cali. — Col. E. Dryander.

Género:

OENOCARPLIS MART.

Oenocarpus Bacaba Mart. (Turú, mohi, milpesosor.) Afluentes del Amazonas. — Col. Martius.

O. circumstextus Mart. (Palma resina). Rio Caquetá. — Col. Mart.

O. distichus Mart. (Bacaba, patahúa, Palma de aceite de olivas). Amazonas y afluentes. — Col. Mart.

O. Dryanderæ Burret. Buenaventura. Col. E. Dryander.

O. grandis B. (Bacaba grande). Hoya amazónica. — Col. Hopp.

O. Hoppii B. (Batahuá). Reg. amazónicas. — Col. Hopp.

O. iriartoides Tr. (Corneto zancón). Cartago, Valle. — Col. Triana et Karsten.

O. mapora Karst. (Mapora). Llanos orientales. — Col. Karst.

Género:

ORBIGNYA MART.

Orbignya racemosa Mart. ((Piasaba verdadera). Reg. amazónicas. — Col. Wallis.

O. Eichleri Mart. (Piasaba pindoba). Reg. amazónicas. — Col. Weddel.

Género:

PHOENIX L.

Phoenix dactilifera L. (Dátil, datile-

ra). Valle del Cauca. Según Burret.

Ph. reclinata Jacq. (Datilera ornamental). Parques del pas. Según Burret.

Género:

PHOLIDOSTACHYS WENDL.

Pholidostachys Kalbreyeri Wedl. Cinegeta. Ant.—Col. Kalb.

Género:

PHYTELEPHAS RUIZ ET PAVON

Phytelepas dasyneura Burret. (Nume blanco). Caquetá, Orteguzaza. Col. Woronow.

Ph. Kartenii Cook. (Tagua calentana). Río Magd.—Col. Triana.

Ph. Schultii Wendl. (Tagua intermedia?) Río Magd., Ocaña. —Col. Purdie.

Ph. Seemanii Cook. (Cabeza de negro, tagua costeña). Costas del Pacífico.—Col. Purdie.

Ph. tumacana. (Tagua tumaqueña). Tumaco.—Col. Cook & Baker.

Género:

PYRENOGLYPHIS KARAT.

Pyrenoglyphis aristata (Mart). Burret. (Marajá, chontaduro). Río Caquetá.—Col. Maritus.

P. tenera (Karst) B. (Lata arroye-

ra, tenera). Río Magd. — Col. Karst.

P. major. (Jacq.) Karst. (Lata gallinazo, corotero). Costa Atlántica.—Col. Shultz.

Género:

RAPHIA BEAUV.

Raphia tuedigera Mart. (Holillo choicano). Chocó y Darién. Según Bailey.

Género:

ROYSTONEA COOK.

Roystonea regia (H. B. K.) Kook. (Palma real cubana). Cali. Según Bailey.

R. Jenmannii (Wright) Burret. (Palma real fruti-coriacea). Cali. Según Burret.

P. oleracea. (Palma real mediana). Valle. Según Burret.

Género:

SABAL ADAMS.

Sabal mauritiaefolia (Karst) Gr. & Wendl. (Palmicho, abanico calentano, Palma amarga). Rios Cauca y Magd.—Col. Karst.

Género:

SCHEELEA KART.

Scheelea attaleoides Karst. (Yagua llanera). Llanos orientales.—Col.

Karst.

S. butyracea (Mart) Karst. (Palma calentana de vino, curmates). Climas calientes.—Col. Mutis.

S. Dryanderæ Burret. (Palma gruesa, cuesco calentano, palma real de cuesco, palma de puerco). Cali y Quindío.—Col. E. Dryander.

S. Dryanderæ var. según Burret. (Palma real de cuesco tolimense). Col. Duque J.

S. insignis (Mart) Karst. (Inaja, caruay). Reg. orientales. — Col. Martius.

S. rostrata (Oerst) Burret. (Almendrón cimarrón, cabeza de guagua, borugo). Valle del Cauca. Según Burret.

Género:

SOCRATEA KARST.

Socratea altissima (Klotszch) Burret. (Corneto grande). Colombia. Según Bailey.

S. durissima. (Jira chocana). Chocó. Según Bailey.

S. exorrhiza (Mart) Wendl. (Pachuca, paxiuba). Amazonas y Chocó.—Col. Martius.

Género:

SYAGRUS MART.

Syagrus argentea (Engel). (Guirache). Beec. Col. y Venez.—Col. Engel.

S. sancona (H. B. K.) Karsten. (Macana zancona, macana ornamental).

Género:

WASHINGTONIA WENDL.

Washingtonia robusta Wendl. (Palma gruesa de abanico). Parques de Cali. Según Bailey.

W. filifera Linden. (Palma delgada de abanico). Parques de Cali. Según Bailey.

Género:

WETTINIICARPUS BURRET.

Wettiniicarpus fascicularis Burret. Antioquia.—Col. Kalb.

Género:

WETTINIA PEEPP.

Wettinia hirsuta Burret. (Maquenque, cusuy, casay?). Canoas, Antioquia.—Col. Kalb.

W. quinaria (Cook & Doyle) Burret. (Gualte). Valle.—Col. Doyle.

Género:

WELFIA WENDL.

Welfia regia Wendl. (Palma colorada). Cauca, Cauca. — Col. Wallis.